

CRITERIOS DE NO ASISTENCIA AL CENTRO POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Las enfermedades infecciosas transmisibles de persona a persona son frecuentes entre el alumnado de todos los centros educativos.

Son trastornos causados por organismos como virus, hongos o parásitos. Muchos de estos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos, y muchas veces son inofensivos; sin embargo, bajo ciertas condiciones, pueden causar enfermedades.



EXCLUSIÓN ESCOLAR

En general, no es necesario excluir a ningún alumno/a que padezca una enfermedad infecciosa, pero, teniendo en cuenta el alto nivel de transmisión que pueden tener, **se recomienda la no asistencia a las aulas durante un período de tiempo determinado** y según los síntomas que se presenten. Este período de no asistencia tiene como objetivo disminuir el riesgo de contagio entre el alumnado de la misma clase y evitar la propagación en el resto del centro educativo.

Se indicará la no asistencia si se presentan alguno de los siguientes casos:

- La enfermedad no permite que el alumno/a realice las actividades escolares con normalidad.
- El alumno presenta: fiebre, letargia, irritabilidad, llora constantemente, respira con dificultad u otros signos que evidencien un empeoramiento del estado general de su salud.
- La enfermedad requiere de una atención especial por parte del profesorado a cargo del alumno/a, lo que hace reducir la atención al resto del alumnado.



Clasificación de la fiebre – Temperatura axilar

36,0 °C hasta 37,0 °C	Temperatura normal
37,1 °C hasta 38,1 °C	Febrícula
38,1 °C hasta 38,5 °C	Fiebre leve
38,5 °C hasta 39,0 °C	Fiebre moderada
A partir de 39,0 °C	Fiebre alta

ENFERMEDADES	PERÍODO DE NO ASISTENCIA ALCOLEGIO	MEDIDAS/CONSEJOS ADICIONALES
Gripe	Hasta su recuperación; sin fiebre y mejoría del estado general.	En alumnos con patologías crónicas se recomienda la vacunación anual.
Catarro	No es necesaria la exclusión escolar si no presenta fiebre y/o dificultad respiratoria	No se debe acudir a la escuela en presencia de fiebre, dolor de oído, dificultad respiratoria o malestar general
Infección aguda de vías altas	24 horas sin fiebre y que tolere la actividad general.	
Faringitis estreptocócica	24 horas después de iniciar el tratamiento y si no presenta fiebre.	
Amigdalitis vírica	No es necesario excluir de la escuela si no presenta fiebre.	No necesita tratamiento antibiótico.
Amigdalitis estreptocócica	24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico siempre que no presente fiebre.	Amigdalitis bacteriana que precisa antibiótico.
Exantema súbito	No es necesaria la exclusión de la escuela	
Herpes Zoster	Excluir solo si las vesículas supuran y no se pueden cubrir.	Pueden causar varicela en aquellos que no la hayan pasado. Se contagian por contacto directo y próximo.
Varicela	Hasta, mínimo, 6 días después de iniciada la erupción o hasta que todas las lesiones estén en forma de costra.	
Impétigo Contagioso	48 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico o cura de las lesiones expuestas.	
Boca - Mano - Pie	No es necesaria la exclusión de la escuela	No puede asistir a la escuela si presenta fiebre, malestar, necesita alguna atención diferente de la habitual o las llagas de la boca no le permiten comer.
Molusco contagioso	No es necesaria la exclusión de la escuela	No realizar deportes que impliquen contacto estrecho. Precaución con moluscos en zonas descubiertas susceptibles de roce con otras personas (piscinas). Uñas cortas. Es mejor taparlos para evitar la
Mononucleosis	Hasta que tolere la actividad general.	Medidas higiénicas, reposo, alimentación correcta
Conjuntivitis purulenta	Hasta 24 horas de iniciar el tratamiento	
Pediculosis (Piojos)	Hasta 24 horas después de que se haya iniciado tratamiento.	Todos los alumnos parasitados deben ser tratados simultáneamente. Es recomendable que los alumnos afectados no asistan a la escuela hasta que no hayan terminado el tratamiento y se hayan eliminado todas las liendres. Durante la semana posterior al inicio del tratamiento, cada día se debe revisar el cabello y quitar las liendres que puedan quedar. De lo contrario, el tratamiento no será efectivo.
Gastroenteritis	Hasta 48 horas después de la última diarrea o vómito	En caso de diarreas por Salmonella, Shigella o E. coli se cambió el protocolo, consultar con pediatría
Lombrices	No precisa	Realizar baños por las mañanas para eliminar los huevos puestos durante la noche (incidir en zona perianal). Uñas cortas y lavado de manos frecuente. Habrá que tratar a toda la familia.
Vómitos aislados	Según el motivo, valorar quedarse en casa y observar evolución.	Lavado frecuente de manos, hidratarse y dieta blanda.